



Chapitre 3

Le tissu conjonctif non spécialisé

INTRODUCTION

Le tissu conjonctif **proprement dit** (non spécialisé) est présent dans tout l'organisme, occupe les espaces libres entre les autres tissus. Il joue un rôle de remplissage ou de soutien, de nutrition et de protection. Il est formé de **cellules** séparées par **une substance fondamentale** (matrice) contenant des fibres de trois types : **fibres de collagène, de réticuline et élastiques.**

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU TISSU CONJONCTIF

I. La substance fondamentale ou matrice extracellulaire

La substance fondamentale homogène, amorphe, occupe les espaces compris entre les cellules et les fibres du tissu conjonctif. Elle contient des substances telles que (collagène et élastine) des protéoglycanes et des glycoprotéines, des polypeptides, acides aminés, glucose, de l'eau, de sels minéraux et substances exogènes provenant du plasma sanguin.

La structure de la substance fondamentale en gel aqueux autorise, la diffusion efficace des nutriments, des métabolites et des déchets hydrosolubles ainsi que la migration des cellules étrangères à travers les tissus-conjonctifs.

II. Les Fibres du tissu conjonctif

Il existe trois variétés : les fibres de collagène, les fibres de réticuline et les fibres élastiques.

1. Les Fibres de Collagène

Elles sont les plus abondantes, longues et sinueuses, sous forme de ruban ou cylindre de 7-10 μ m de largeur et groupées en faisceaux parallèles.

- **En microscope optique** ces fibres sont non anastomosées, extensibles mais non élastiques.

Elles sont constituées par une protéine, le collagène, qui représente 30 à 35 % des protéines totales de l'organisme humain.

Les fibres de collagènes sont résistantes aux tractions et aux forces mécaniques, souples, insolubles dans l'eau froide et solubles dans l'eau chaudes. Le collagène est une **protéine fibreuse** visible en microscopie optique :le **safran** les colore en **jaune**, le **trichrome de Masson** en **vert ou en bleu**,


- **En microscopie électronique**, les fibres sont constituées par un assemblage en faisceaux. Elles sont :

-Limitées par une gaine externe, la gaine ou **membrane de Henlé**.

-Les **fibrilles** d'un diamètre 200 à 2000 Å et d'une longueur de 10 à 100 μ m, présentent **une structure périodique** caractérisée par une alternance régulière de **bandes sombres et de bandes claires** avec une périodicité de 64 - 67 nm.

- Chaque fibrille correspond à l'agrégation de **micro fibrilles** d'un diamètre de 100 à 200A° et présentent la même striation transversale. Les micros fibrilles sont formées de la macromolécule : **Le tropocollagène**.

-**Le tropocollagène** est l'unité moléculaire fondamentale du collagène. Il s'agit d'une **glycoprotéine** formée par l'enroulement en hélice de 3 chaînes polypeptidiques, porteuses de glucides (glucose, galactose). Les acides aminés, dont **la proline, lysine, glycine, hydroxyproline et l'hydroxylysine**.



- | | | | |
|---|----------|---|----------------|
| 1 | Faisceau | 4 | micro fibrille |
| 2 | Fibre | 5 | tropocollagène |
| 3 | Fibrille | 6 | Chaines alpha |


Différents types de collagène, les plus fréquents sont :

- **Le collagène de type I** : Le plus abondant (**90% du collagène**). Il forme des fibres épaisses, larges, résistantes. Sa propriété principale est la résistance à la traction. Exemples : tendons, ligaments, derme et le cartilage fibreux. Ce collagène est fabriqué par les **fibroblastes**, les cellules **cartilagineuses** et les **ostéoblastes**.
- **Le collagène de type II**: forme des fibres minces on le trouve dans **le tissu cartilagineux** (cartilage hyalin). Il est fabriqué par les fibroblastes et les cellules cartilagineuses.
- **Le collagène de type III** forme des fibrilles, dites **réticuline** : on le retrouve surtout dans les organes hématopoïétiques, vaisseaux, poumons, foie dans les tissus lymphoïdes).
- **Le collagène de type IV**: important dans la constitution de **la membrane basale**. Il sert de support de filtration entre le tissu épithélial et le tissu conjonctif sous-jacent.

2- Les Fibres de Réticuline


-Elles constituent un réseau **plus ou moins anastomosé**, entrecroisé de fibres invisibles en microscope optique. En microscope électronique, les fibres sont isolées ou associées en petits faisceaux et apparaissent plus fines que les fibres de collagène.

Les fibres de réticulines ressemblent à des fibres de collagènes récemment formées. Elles présentent les mêmes striations transversales que les fibrilles de collagène (à périodicité variant de 64 à 67 nm). Se trouvent dans les organes hématopoïétiques (**ganglions lymphatiques, rate, moelle osseuse, foie, reins et muscles**).




A-Microscopie optique

B- Microscopie électronique



3- Les Fibres Élastiques

Constituent un réseau de fibres **anastomosées**, ramifiées, extensibles et élastiques, longues et de faible diamètre (0,2-2 μ m). Procurent une force de traction, mais reviennent à leur état primaire lorsque la tension cesse. Elles sont composées de l'élastine (protéine fibreuse). Se trouvent dans le ligament jaune intervertébral, le cartilage élastique et les organes qui se dilatent souvent : poumon, la paroi des grosses artères et la vessie.



Fibres élastiques vue au MO

III-La cellule souche mésenchymateuse et les différentes cellules du tissu conjonctif proprement dit

1. La cellule souche mésenchymateuse (CSM)

Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont des cellules souches d'origine mésodermique présentes dans divers types de tissus de l'organisme adulte, tels que la moelle osseuse ou le tissu adipeux. Les cellules souches mésenchymateuses peuvent proliférer jusqu'à la 40^e génération et se différencier en cellules d'origine mésodermique, l'os, le cartilage, le tissu adipeux et le conjonctif proprement dit, le muscle lisse, les ligaments et les tendons, c'est une cellule à grand pouvoir de différenciation.

2. Les différentes cellules du tissu conjonctif non spécialisé

Les cellules du tissu conjonctif dérivent directement de la cellule mésenchymateuse indifférenciée.

On distingue deux catégories de cellules conjonctives :

– des éléments fixes qui ont essentiellement des propriétés élaboratrices ;

– des éléments mobiles ou plus ou moins susceptibles de se mobiliser et qui par des processus divers constituent l'essentiel des systèmes de défense de l'organisme.


A- Les Cellules Fixes

Ce sont les véritables cellules conjonctives, elles représentent les cellules permanentes.

1. Les fibroblastes (20 à 30µm de long et de 5 à 10 µm de diamètre)

Est la **principale** et **permanente** cellule du tissu conjonctif, cellule fusiforme ou étoilée avec de long prolongements cytoplasmiques. Le noyau central, ovoïde ou allongé. Le cytoplasme **est basophile** et abondant, riche en organites : appareil de golgi juxta nucléaire, le réticulum endoplasmique granuleux et mitochondries sont nombreux.

- Le fibroblaste est une cellule active qui assure l'élaboration des constituants de la matrice du tissu conjonctif, assure la synthèse des fibres de collagènes (tropocollagène).
- Les fibroblastes ont un rôle très important dans le processus de cicatrisation, et jouent un rôle important dans l'entretien des réactions inflammatoires.
- Lorsque son activité diminue, le fibroblaste devient un fibrocyte définitivement au repos, plus fusiforme, le noyau est nettement plus condensé, le cytoplasme est moins abondant, **acidophile** et pauvre en organites.





Fibroblaste et Fibrocyte

2. Les adipocytes


2.1 Les adipocytes de la graisse blanche (adipocytes blancs 50-150µm)

Sont de grosses cellules remplies de lipides, elles sont constituées par une vacuole centrale qui prend toute la place(uniloculaire) refoulant les autres éléments du cytoplasme à la périphérie, avec un noyau excentré déformé et aplati. Cette cellule joue un rôle métabolique important car elle constitue d'une part un réservoir d'énergie pour l'organisme et d'autre part elle assure une fonction de protection mécanique des organes. Les lipides se colorent **en noir** par **l'acide osmique** ou par **le noir soudan**.



2.2 Les adipocytes de la graisse brune (adipocytes bruns 20 - 30µm)

Ce sont des cellules sphériques ou polygonales à noyau central, au cytoplasme riche en vacuoles lipidiques (**adipocytes multiloculaires**) et en mitochondries. Ces cellules portent sur leur surface une protéine, la **thermogénine**, qui permet la conversion de l'énergie produite par les mitochondries en chaleur. On les trouve chez le fœtus et le nourrisson.



B. LES CELLULES MOBILES (EXTRINSEQUES OU DE PASSAGE)

1. Les histiocytes et les Macrophages

L'histiocyte est le type quiescent ou inactif (immature) du **macrophage**. Les macrophages proviennent des monocytes sanguins qui ont migré dans la matrice conjonctive, exercent leur fonction de défense de l'organisme dans les tissus conjonctifs. Ce sont des cellules généralement d'assez grande taille (25 à 50µm) qui ont un contour irrégulier avec des prolongements cytoplasmiques constituant des pseudopodes. Leur cytoplasme est riche en organites de synthèse de défense contre les agents étrangers (lysosomes primaires, secondaires et phagolysosomes).

Les macrophages contribuent à la destruction des corps étrangers. Ils jouent un rôle dans la phagocytose, la sécrétion de substances toxiques et le déclenchement de réactions immunitaires.

Les macrophages sont caractérisés par des propriétés de :

- **Mobilité ,phagocytose et sécrétion** (hydrolases acides), des interleukines...

2. Les Mastocytes 20µm

La cellule est arrondie ou ovoïde à noyau central arrondi, le cytoplasme est bourré de granulations qui renferment de nombreux composants chimiques et en particulier ; de **l'héparine, de la sérotonine et d'histamine** qui sont libérés par exocytose au cours des phénomènes d'inflammation ou d'allergie. - **L'héparine** : un anticoagulant.



-**L'histamine** : un agent vasodilatateur qui augmente la perméabilité capillaire et intervenant dans les **processus allergiques**.

- **La sérotonine** : agent vasoconstricteur.
- **La sécrétion d'acide hyaluronique** : intervient dans le métabolisme de la substance fondamentale des tissus conjonctifs et dans l'inflammation



3. Les Plasmocytes 10 à 20µm

. Les **plasmocytes** dérivent des **lymphocyte B**, ce ont des cellules ovoïdes de 10 à 20µ à cytoplasme très basophile à noyau excentré est sphérique dont la chromatine est organisée en **rayon de roue**.



Possèdent un appareil de golgi volumineux juxta nucléaire et un réticulum endoplasmique granuleux abondant. Ces cellules fabriquent les anticorps, (ou immunoglobuline) molécules impliquées dans la défense immunitaire.. On peut les voir dans le tissu de cicatrisation, autour des greffes ou de certaines métastases cancéreuses.



Macrophages



Mastocytes



Plasmocyte

VI. LES PRINCIPALES VARIETES DE TISSU CONJONCTIF NON SPECIALISE

Il existe plusieurs variétés de tissu conjonctif qui sont classées en fonction de :

- La quantité relative des trois composants (cellules, fibres et substance fondamentale)
- La nature des fibres
- L'orientation des fibres.

Selon l'élément qui prédomine, on distingue :

1- Tissu conjonctif lâche (sans prédominance)

Lorsque les trois principaux constituants du tissu conjonctif proprement dit (cellules, fibres conjonctives et substance fondamentale) sont en proportions équivalentes ou « équilibrées » le tissu conjonctif est appelé lâche. On le trouve à la partie profonde de la peau, entre les masses musculaires et le chorion des voies respiratoires, digestif, des voies génitales et urinaires...

Le rôle que joue le tissu conjonctif lâche dans l'organisme est important et complexe, il possède un rôle de **soutien** et d'emballage des tissus et organes ; il assure le passage de nombreuses substances entre le sang et les tissus ; siège des cellules du système immunitaire (lymphocytes, plasmocytes, macrophages et mastocytes), il joue un rôle majeur dans les réactions inflammatoires ainsi que dans les processus de cicatrisation (par prolifération des fibroblastes et production des macromolécules de la MEC). Figure 1.

2- Tissu conjonctif dense à prédominance de fibres de collagène

Le tissu conjonctif dense est compact, résistant, très riche en fibres de collagènes qui forment des faisceaux épais. Les cellules sont moins nombreuses que dans le tissu conjonctif lâche et la substance fondamentale est moins abondante.

Selon que ces fibres de collagènes organisées en faisceaux soient disposées régulièrement ou non.

On distingue :

2-1 Tissu conjonctif dense non orienté (irrégulier)

Contiennent des fibres de collagènes sans orientation particulière. On les rencontre dans le derme, périoste. Il donne une bonne résistance et protège les organes. Figure 2.

2-2 Tissu conjonctif dense orienté

Ces tissus possèdent des fibres de collagènes orientées parallèlement les unes aux autres et dans une ou plusieurs directions. On distingue :

a) Tissu conjonctif dense orienté (régulier) unitendu

Est constitué de faisceaux de fibres de collagènes disposées dans la même direction exp: ligaments et tendons. **Fig. 3.**

b) Tissu conjonctif dense orienté bitendu

Exp. Cornée et Les aponévroses (tissus conjonctifs entourant les muscles). Les fibres sont disposées parallèlement. Les fibres de chaque plan sont perpendiculaires aux fibres des plans adjacents. **Fig. 4**

3- Le tissu conjonctif à fibres élastiques prédominantes

Tissu conjonctif à prédominance de fibres élastiques, sont rares dans l'organisme humain. On les rencontre essentiellement au niveau des ligaments jaunes de la colonne vertébrale de certains mammifères les ligaments des cordes vocales et les artères élastiques. **Fig. 5**

4- Le tissu conjonctif réticulé

Les tissus conjonctifs à prédominance de fibres de réticuline, sont particuliers à des organes comme le foie ou les organes lymphoïdes et hématopoïétiques (rate et moelle). **Fig.6**

5- Le tissu conjonctif muqueux (à substance fondamentale prédominante)

Inexistant chez l'adulte, il s'agit essentiellement d'un tissu conjonctif de type embryonnaire, rencontré, dans la gelée de Wharton (tissu conjonctif du cordon ombilical).

Il est très peu réparti. Il est pauvre en cellules et en fibres. La substance fondamentale est abondante et riche en eau, en glucosaminoglycanes et en protéoglycanes. Il n'y a pratiquement pas de collagène. **Fig.7**

6- Le tissu conjonctif adipeux

T.C. à prédominance cellulaire ou les cellules adipeuses (adipocytes) sont associées les unes aux autres par des capillaires sanguins. Chaque cellule est entourée par un fin réseau de fibres de réticuline, exp. L'hypoderme, moelle osseuse, la nuque, les hanches, cuisses, fesses. **Fig.8**




Figure 1 : Tissu conjonctif lâche sans prédominance




Figure 2 : Tissu conjonctif dense non orienté




Figure 3 : Tissu conjonctif dense orienté unitendu




Figure 4 : Tissu conjonctif dense orienté bitendu




Figure 5 : Tissu conjonctif élastique



Figure 6 : Tissu conjonctif réticulé




Figure 7 : Tissu conjonctif muqueux





Figure 8 : Tissu conjonctif adipeux